

Қазақстандағы ОПВ вакцинасы: полиомиелитке қарсы екпе

Кімге және қайда істеу керек



Қазақстан Республикасының Ұлттық вакцинация күнтізбесіне сәйкес ОПВ вакцинасы **балаларға 12-15 айында енгізіледі.**

Қандай вакцина қолданылады

- Қауіпсіз
- Тиімді вакциналар
- Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен мақұлданған және әлемдегі жетекші вакцина өндірушілерден Қазақстан Республикасында тіркелген



Инфекциядан қорғайтын, ОПВ вакцинасы



Полиомиелит — бұл жүйке жүйесіне әсер ететін және бірнеше сағат ішінде қайтымсыз сал ауруына әкелуі мүмкін вирус тудыратын өте жұқпалы ауру.

Полиомиелит адамнан адамға таралады: вирус ағзаға ауыз арқылы еніп, ішекте көбейеді. Содан кейін ол қоршаған ортаға нәжіс арқылы енеді, онда ол қауымдастық ішінде тез таралуы мүмкін, әсіресе нашар гигиена мен антисанитарлық жағдайда таралады.

Басқаларында алғашқы белгілер:

- қызба,
- шаршау,
- бас ауруы,
- құсу,
- желке сіреспесі,
- аяқ-қолдарының ауырсынуы.

Жұқтырған адамдардың көпшілігінде (90%)

белгілері жоқ немесе әлсіз және әдетте танылмаған болды.



Полиомиелиттің емі жоқ, тек ауру белгілерін жеңілдететін ем бар.

Асқынулар мен қарсы көрсеткіштер

Полиомиелиттің асқынулары көп және парездер мен сал ауруының дамуымен байланысты:

- полиомиелиттік сал ауруы
- пневмония
- миокардит
- асқазанның жедел кеңеюі
- асқазан-ішектен қан кету
- ішек өтімсіздігі

Полиомиелиттің асқынуын вакцинация арқылы болдырмауға болады.

ОПВ вакцинасына қарсы жалпы көрсеткіштер

Тұрақты қарсы көрсетілімдер:

- 1) ОПВ алғашқы дозасын енгізген соң 30 күн ішінде **паралич немесе парез дамуы**;
- 2) жұлынның бұлшықет **атрофиясы**;
- 3) **иммунитет тапшылығының дәрежесіне** қарамастан адамның иммун тапшылығы вирусы тудырған ауру;
- 4) осы вакцинаны алдын ала енгізгеннен кейін **48 сағат ішінде дамыған ауыр реакция** (дене температурасының 40 градус Цельсий және одан жоғары көтерілуі, үш немесе одан да көп сағатқа созылған, әдеттен тыс жылау синдромы, фебрильді немесе афебрильді құрысулар, гипотониялық-гипореактивті синдром);
- 5) вакцинаның алдыңғы дозасын немесе вакцинаның кез келген компоненттерін енгізгеннен кейінгі **ауыр аллергиялық реакция** (соның ішінде анафилаксия). Вакцинациядан кейін 7 күнтізбелік күн ішінде дамитын басқа дәлелденген себеппен байланысты емес энцефалопатия (кома, сананың депрессиясы немесе ұзаққа созылған құрысулар).

Асқынулар мен қарсы көрсеткіштер

Уақытша қарсы көрсетілімдер:

- 1) орталық жүйке жүйесінің жіті аурулары** (менингит, энцефалит, менингоэнцефалит) — вакцинация толық сауығып кеткеннен кейін бір айға дейін кейінге қалдырылады;
- 2) жедел гломерулонефрит** — вакцинация сауығып кеткеннен кейін 6 айға дейін кейінге қалдырылады, нефротикалық синдром – вакцинация кортикостероидтармен емдеу аяқталғанға дейін кейінге қалдырылады;
- 3) орташа және ауыр дәрежедегі** жедел инфекциялық және жұқпалы емес аурулар, температураға қарамастан — вакцинация қалпына келгеннен кейін 2-4 аптадан кейін рұқсат етіледі;
- 4) әртүрлі патологиялар үшін стероидтерді**, сондай-ақ иммуносупрессивті қасиеттері бар басқа препараттарды қолдану. Ерекшелік - мамандардың қорытындысынан кейін бірқатар вакциналарды (тұмауға, В гепатитіне, пневмококкқа қарсы) қолдану көрсетілген лейкозбен ауыратын, органдар мен тіндерді трансплантациялаудан кейінгі жағдайлар, апластикалық анемия, иммундық тромбоцитопения және басқа да қан аурулары. (гематолог, иммунолог немесе басқалар);
- 5) созылмалы аурулардың өршуі** — вакцинация кейінге қалдырылады және тұрақты ремиссия кезеңінде емделгеннен кейін жүргізіледі;
- 6) прогрессивті немесе тұрақсыз неврологиялық бұзылулар**, бақыланбайтын құрысулар немесе прогрессивті энцефалопатия — вакцинация емдеу аяқталғанға және жағдайды толық тұрақтандыруға дейін кейінге қалдырылады.



Жағымсыз әсерлер

Өте сирек <1/10,000, 0,01%-дан кем



Өте сирек жағдайларда (миллионға 1-4), негізінен иммун тапшылығы бар балаларда вакцина вакцинамен байланысқан паралитикалық полиомиелитті (ВБПП) тудыруы мүмкін. Алдымен балаға инактивацияланған полиовакцинамен (ИПВ) егетін болсақ, болу мүмкін қауіпті нөлге дейін төмендете аламыз.

Қазақстан бойынша көптеген вакцинация орталықтары жұмыс істейді. Сіз кез-келген адамға хабарласып, балаңызға вакцинация жасай аласыз.



Вакциналар мен олардан қорғайтын аурулар туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз:

egu.kz