

Қазақстанда ВГВ вакцинасы: В вирустық гепатитіне қарсы

Кімге және қайда істеу керек



Қазақстан Республикасының Ұлттық вакцинациялау күнтізбесіне сәйкес ВГВ вакцинасы балаларға өмірінің **1-4 күнінде, сондай-ақ 2 және 4 айында енгізіледі.**



Қандай вакцина қолданылады

- Қауіпсіз
- Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бекіткен тиімді вакциналар
- Қазақстан Республикасында ресми тіркелген, әлемнің жетекші вакцина өндірушілерінен



Инфекциядан қорғайтын ВГВ вакцинасы




Гепатит В — бұл бауырдың өмірге қауіпті жұқпалы ауруы, оның қоздырғышы В гепатиті вирусы (HBV)

Көбінесе беріледі:

- Босану кезінде анадан балаға (перинаталдық берілу)
- Отбасылық шеңбер ішінде көлденең берілу нәтижесінде (ластанған қанмен байланыста), әсіресе бес жасқа дейінгі балалар арасында.

Сонымен қатар :

- Татуировка және пирсинг жасағанда стерильді емес аспаптар мен инелер арқылы берілу
- Вирус жұқтырылған қан, дене сұйықтықтары (сілекей, етеккір, қынап секрециясы, шәует) арқылы



Асқынулар және белгілері

Асқынулар

Көп жағдайда бастапқы инфекция симптомсыз ағымды болады. Дегенмен, кейбір пациенттерде бірнеше аптаға созылатын айқын белгілері бар жіті жағдайлар сақталады:

- Терінің және склераның сарғаюы,
- зәрді қоюлануы,
- қатты әлсіздік,
- жүрек айнуы,
- құсу,
- іштің ауыруы.



Асқынулар

В редких случаях острый гепатит может привести к развитию острой печеночной недостаточности с риском летального исхода.



Вирус гепатита В также может вызывать хроническое инфекционное заболевание печени, которое со временем может развиваться в цирроз (рубцевание печени) или рак печени.



В гепатитінің асқынуын **вакцинация арқылы** болдырмауға болады.

Қарсы көрсеткіштер

В вирустық гепатитіне вакцинасына қарсы жалпы көрсеткіштер

Тұрақты қарсы көрсетілімдер:

- 1)** Ашытқы тәріздес саңырауқұлақтардың, бактериялардың немесе вакциналарды өндіру кезінде қолданылатын басқа жасушалардың компоненттеріне **дереу аллергиялық реакциялар**;
- 2)** Осы вакцинаны алдыңғы енгізгеннен кейін **48 сағат ішінде дамыған ауыр реакция** (дене температурасының 40 градус Цельсий немесе одан жоғары көтерілуі, ұзақ, үш немесе одан да көп сағатқа созылған әдеттен тыс жылау синдромы, фебрильді немесе афебрильді құрысулар, гипотониялық-гипореактивті синдром);
- 3)** Вакцинаның алдыңғы дозасын немесе вакцинаның кез келген құрамдас бөлігін енгізгеннен кейінгі **ауыр аллергиялық реакция** (соның ішінде анафилаксия).
Вакцинациядан кейін 7 күнтізбелік күн ішінде дамитын басқа дәлелденген себеппен байланысты емес энцефалопатия (кома, сананың депрессиясы немесе ұзаққа созылған құрысулар).



Қазақстан бойынша көптеген екпе орталықтары бар.

Қарсы көрсеткіштер

В вирустық гепатитіне вакцинасына қарсы жалпы көрсеткіштер

Уақытша қарсы көрсетілімдер:

- 1) Шала туылғандар**, туған кездегі дене салмағы 2000 грамнан аз.
- 2) Орталық жүйке жүйесінің жедел аурулары** (менингит, энцефалит, менингоэнцефалит) - вакцинация толық қалпына келгеннен кейін бір айға дейін кейінге қалдырылады;
- 3) Жедел гломерулонефрит** — егу сауыққаннан кейін 6 айға дейін кейінге қалдырылады, нефротикалық синдром - вакцинация кортикостероидтармен емдеу аяқталғанға дейін кейінге қалдырылады;
- 4) Температураға қарамастан орташа және ауыр дәрежедегі жедел инфекциялық және инфекциялық емес аурулар** – сауығудан кейін 2-4 аптадан кейін вакцинациялауға рұқсат етіледі;
- 5) Өртүрлі патологиялар үшін стероидтерді**, сондай-ақ иммуносупрессивті қасиеттері бар басқа да препараттарды қолдану. Ерекшелік - мамандандырылған мамандардың қорытындысынан кейін бірқатар вакциналарды (тұмауға, В гепатитіне, пневмококкқа қарсы) қолдану көрсетілген лейкозбен ауыратын, органдар мен тіндерді трансплантациялаудан кейінгі жағдайлар, апластикалық анемия, иммундық тромбоцитопения және басқа да қан аурулары. (гематолог, иммунолог немесе басқалар);
- 6) Созылмалы аурулардың өршуі және өршуі** – вакцинация кейінге қалдырылады және тұрақты ремиссия кезеңінде емделгеннен кейін жүргізіледі;
- 7) Үдемелі немесе тұрақсыз неврологиялық бұзылулар, бақыланбайтын құрысулар немесе үдемелі энцефалопатия** – егу емдеу аяқталғанға және жағдайды толық тұрақтандыруға дейін кейінге қалдырылады.

Жағымсыз әсерлер

Өте жиі $\geq 1/10$, 10%-дан астам



- инъекция орнында ауырсыну

Жиі $\geq 1/100$, бірақ $< 1/10$, 1%-дан артық, бірақ 10%-дан кем



- инъекция орнында қызару, ауырсыну, ісіну, қаттылық,
- вакцинациядан кейін екі күн ішінде өздігінен кететін температураның шамалы көтерілуі,
- гематомалар, эритематозды бөртпе, эритема, ұйқысыздық, нервозность, тітіркену, лакримация, ұйқышылдық, анорексия, іштің ауыруы, диарея, құсу, безгегі, индурация, ісіну, ауыру, қабыну

Сирек $\geq 1/1,000$, бірақ $< 1/100$, 0,1%-дан артық, бірақ 1%-кем



- дене температурасының көтерілуі ($38,8^{\circ}\text{C}$ -тан жоғары)
- дімкәстік, шаршау, шаршағыштық, бас ауруы, бас айналу
- тері бөртпесі
- жүректің айнуы, құсу
- миалгия, артрит
- трансаминазалар белсенділігінің өтпелі жоғарылауы
- кандидоз, ринит
- қызғылт теміреткі, бөртпе, макуло-папулярлы бөртпе
- жаңа туылған нәрестелердің сарғаюы
- температураның жоғарылауы
- анафилактикалық реакциялар

Өте сирек $< 1/10,000$, 0,01%-дан кем



- полиневрит, көру жүйкесінің невриті, бет жүйкесінің сал ауруы, шашыраңқы склероздың өршуі
- Гийен-Барре синдромы (1:200 000)

Вакциналар мен олардан қорғайтын аурулар туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз:

egu.kz